

PMRA Approved Label, CK
2024-6099, 2025-04-10

Bag Label

GROUPE M3 FONGICIDE

MANZATE^{md} PRO-STICK^{md}
FONGICIDE

EN GRANULES DISPERSABLES

USAGE COMMERCIAL

N° D'HOMOLOGATION 28217 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



AVERTISSEMENT

POISON

**DANGER-IRRITANT POUR LES YEUX
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL**

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE DÉPLIANT JOINTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF : Mancozèbe 75,0 %

CONTENU NET: 2.5 - 25 KG

UPL AgroSolutions Canada Inc.
PO Box 12219
Research Triangle Park, NC 27709
1-800-438-6071

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE : déversement, fuite, incendie, exposition ou
accident composer le CHEMTREC 1-800-424-9300.

MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ, LA GORGE ET LA PEAU.

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INHALATION OU D'INGESTION.

Éviter de respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Tenir à l'écart du feu et des étincelles.

Retirer rapidement les vêtements contaminés et laver les zones touchées avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Laver soigneusement les vêtements avant de les réutiliser.

Appliquer sur les cultures agricoles seulement si le risque de dérive vers des zones résidentielles et d'activités humaines comme des maisons, des chalets, des écoles et des aires de loisirs est minime. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, d'une éventuelle inversion de température, de l'équipement d'application et des paramètres de fonctionnement du pulvérisateur.

PREMIERS SOINS

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans son contenant d'origine, à l'écart des aliments pour les animaux ou les humains. Veiller à ce que le produit ne soit pas mouillé ou surchauffé pendant l'entreposage. Il peut être l'objet de modifications chimiques qui réduisent son efficacité en tant que fongicide et dégagent des vapeurs inflammables. Garder le contenant hermétiquement fermé.

ÉLIMINATION

1. Vider complètement le sac dans la cuve du pulvérisateur.
2. Rendre le sac inutilisable.
3. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale ou territoriale.
4. Pour obtenir des renseignements sur l'élimination du produit inutilisé ou superflu, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial ou territorial de réglementation responsable. En cas de

déversement et de nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant et à l'organisme provincial ou territorial de réglementation responsable.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

UPL, le logo d'UPL, MANZATE et PRO-STICK sont des marques déposées d'une société du groupe UPL Corporation Limited.

©2021 Société du groupe UPL Corporation Limited.

Directions for Use Booklet

GROUPE M3 FONGICIDE

MANZATE^{md} PRO-STICK^{md}
FONGICIDE

EN GRANULES DISPERSABLES

USAGE COMMERCIAL

N° D'HOMOLOGATION 28217 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



AVERTISSEMENT

POISON

**DANGER-IRRITANT POUR LES YEUX
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL**

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE DÉPLIANT CI-JOINTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF : Mancozèbe 75,0 %

CONTENU NET: 2.5 - 25 KG

UPL AgroSolutions Canada Inc.
PO Box 12219
Research Triangle Park, NC 277091-800-438-6071

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE : déversement, fuite, incendie, exposition ou accident composer le CHEMTREC 1-800-424-9300.

MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ, LA GORGE ET LA PEAU.

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INHALATION OU D'INGESTION.

Éviter de respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Tenir à l'écart du feu et des étincelles.

Appliquer sur les cultures agricoles seulement si le risque de dérive vers des zones résidentielles et d'activités humaines comme des maisons, des chalets, des écoles et des aires de loisirs est minime. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, d'une éventuelle inversion de température, de l'équipement d'application et des paramètres de fonctionnement du pulvérisateur.

Il est interdit d'utiliser ce produit à l'intérieur et à proximité des résidences et d'autres zones résidentielles comme les parcs, les cours d'école et les terrains de jeux. On entend par « milieu résidentiel » tout endroit où des personnes, y compris des enfants, peuvent être exposées pendant ou après l'application. Ce produit ne peut être utilisé par les particuliers.

NE PAS entrer ou permettre aux travailleurs d'entrer dans les sites traités avant la fin du délai de sécurité (DS) indiqué sur l'étiquette. Les employeurs doivent faire tout ce qui est possible pour planifier l'application des pesticides et les tâches des travailleurs de façon à éviter que ceux-ci aient à retourner dans les sites fraîchement traités. Dans des circonstances exceptionnelles, les spécialistes agréés de la lutte antiparasitaire peuvent réintégrer les sites traités pour des tâches de courte durée qui ne nécessitent pas de travail manuel, si au moins 4 heures se sont écoulées depuis l'application, et en portant un vêtement à manches longues, un pantalon long, des bottes résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des lunettes de protection, des gants résistant aux produits chimiques et un respirateur muni d'une cartouche anti-vapeurs organiques approuvée par le NIOSH comportant un préfiltre approuvé pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. Il est interdit de passer plus d'une heure dans les sites traités par période de 24 heures ou avant la fin du délai de sécurité.

Équipement de protection individuelle (EPI)

- Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et la réparation. Des gants ne sont pas requis à l'intérieur d'un équipement à cabine fermée ou dans un poste de pilotage fermé.
- De plus, pendant le mélange et le chargement porter un respirateur avec une cartouche anti-vapeurs organiques approuvée par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvée par le NIOSH approuvée pour les pesticides.
- Lors de l'application d'un pulvérisateur pneumatique en cabine ouverte doivent porter un casque de protection résistant aux produits chimiques. Les casques de protection résistant aux produits chimiques acceptables sont notamment les chapeaux de type So'Wester, les chapeaux imperméables à larges bords, et les capuchons offrant une protection suffisante de la nuque.
- Lors de l'application au moyen d'une rampe de pulvérisation à partir d'une cabine ouverte et le manipulation de plus de 467 kg de produit par personne par jour, les préposés à l'application doivent porter un respirateur muni d'une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH (avec un préfiltre) approuvée pour les pesticides OU un respirateur muni d'une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH pour les pesticides OU utiliser un tracteur à cabine fermée qui forme une barrière physique et fournit une protection des voies respiratoires (p. ex., un dispositif de filtration des poussières et des brouillards ou un dispositif de purification des vapeurs et des gaz) lors de la manipulation de

plus de 467 kg par personne par jour. La cabine fermée doit être munie d'une barrière résistante aux produits chimiques qui isole complètement l'occupant et qui empêche tout contact avec les pesticides présents à l'extérieur de la cabine. Ces restrictions visent à minimiser l'exposition des préposés à l'application. L'application peut devoir être réalisée sur plusieurs jours, ou nécessiter plusieurs préposés à l'application.

- Retirer rapidement les vêtements contaminés et laver les zones touchées avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Laver soigneusement les vêtements avant de les réutiliser

PREMIERS SOINS

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrier un traitement symptomatique.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

- TOXIQUE pour les organismes aquatiques. Respecter les zones tampons de pulvérisation précisées dans le MODE D'EMPLOI.
- TOXIQUE pour les petits mammifères sauvages.
- TOXIQUE pour les oiseaux.
- Ce produit peut être toxique pour les abeilles. Limiter le plus possible la dérive du nuage de pulvérisation afin de réduire les effets nocifs sur les abeilles dans les habitats situés à proximité du site traité. Éviter d'appliquer le produit pendant la période de floraison de la culture. Si le produit doit être appliqué pendant la période de floraison, ne l'appliquer que le soir, lorsque la plupart des abeilles ne sont pas en train de butiner. Éviter d'appliquer le produit lorsque les abeilles butinent dans le couvert végétal contenant des mauvaises herbes en pleine floraison dans le site de traitement. Pour réduire encore davantage l'exposition des insectes pollinisateurs, consulter le document Protection des insectes pollinisateurs durant la pulvérisation de pesticides – Pratiques exemplaires de gestion sur le site Web de Santé Canada (www.canada.ca/pollinisateurs).
- Toxique pour certains arthropodes utiles (qui peuvent comprendre des insectes prédateurs et parasitoïdes, des araignées et des acariens). Limiter le plus possible la dérive du nuage de pulvérisation afin d'atténuer les effets nocifs sur les arthropodes utiles dans les habitats adjacents aux sites traités, comme les haies ou les secteurs

- boisés.
- Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer le produit sur des terrains à pente modérée ou abrupte ou à sol compacté ou argileux.
- Ne pas appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.
- Il est possible de réduire la contamination des milieux aquatiques par le ruissellement en aménageant une bande de végétation filtrante entre le site traité et la rive du plan d'eau.
- Ce produit présente les propriétés et les caractéristiques associées aux substances chimiques détectées dans les eaux souterraines. L'utilisation de ce produit peut entraîner la contamination des eaux souterraines, en particulier dans les zones où le sol est perméable et où la nappe phréatique est peu profonde.

MODE D'EMPLOI

Le fongicide MANZATE PRO-STICK doit être utilisé seulement selon les recommandations stipulées sur cette étiquette. Lorsqu'il est appliqué conformément au mode d'emploi, le fongicide MANZATE DISPERS permet de supprimer les maladies énumérées, sauf indication contraire (répression).

Lorsque les mélanges en cuve sont permis, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux et les restrictions pour chaque produit utilisé dans le mélange en cuve. Suivre les mesures de précaution les plus strictes pour le mélange, le chargement et l'application telles que décrites sur les étiquettes des deux produits.

- NE PAS appliquer ce produit à l'aide d'un équipement portatif.
- NE PAS appliquer à la main.
- NE PAS appliquer ce produit dans les serres.
- Puisque ce pesticide n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles en milieu aquatique, NE PAS l'utiliser à cette fin.
- NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.
- Pour protéger les insectes pollinisateurs, suivre les instructions concernant les abeilles sous la rubrique MISES EN GARDE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT.

Utiliser la dose indiquée du fongicide MANZATE PRO-STICK; pour assurer une bonne couverture, appliquer de 200 à 1000 litres/hectare par voie terrestre ou de 50 à 80 litres/hectare par avion. On peut ajouter au besoin un agent de dispersion/adhésif. Ajouter lentement le fongicide MANZATE PRO-STICK à l'eau en agitant ou prémélanger à fond pour une pulvérisation concentrée ou aérienne. Le mélange doit être agité constamment pour maintenir le produit en suspension.

Mises en garde concernant l'utilisation de l'application

Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables spécifiques à l'épandage aérien décrites dans le *Guide d'apprentissage - Application de pesticides par aéronef*, développé par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides doivent être présentes.

Mises en garde concernant l'opérateur antiparasitaire

Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques pré-mélangés contenus dans un système fermé. Il serait préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'épandage.

Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter des gants, une combinaison et des lunettes ou un masque les protégeant contre les produits chimiques durant le mélange des produits, le chargement, le nettoyage et les

réparations. De plus, pendant le mélange et le chargement porter un respirateur avec une cartouche anti-vapeurs organiques approuvé par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvé par le NIOSH approuvé pour les pesticides. Lorsque les précautions qu'on recommande à l'opérateur de prendre sont plus strictes que les recommandations générales qui figurent sur les étiquettes pour épandage avec pulvérisateur terrestre, suivre les précautions les plus rigoureuses. Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminées régulièrement.

Mises en garde propres au produit

Lire attentivement l'étiquette au complet et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler la compagnie UPL AgroSolutions Canada Inc. au 1-800-438-6071. Pour obtenir des conseils techniques, contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial. L'épandage de ce produit spécifique doit répondre aux exigences suivantes. Volume : Appliquer la dose recommandée avec un volume de pulvérisation minimal de 50-80 litres par hectare. Ajouter lentement le fongicide MANZATE PRO-STICK à l'eau en agitant ou prémélanger à fond pour une pulvérisation concentrée ou aérienne. Le mélange doit être agité constamment pour maintenir le produit en suspension. Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de boire ou de manger. Les vêtements de protection, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminées régulièrement.

Application par voie aérienne : NE PAS appliquer ce produit par calme plat ni lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer lorsque la vitesse du vent excède 16 km/h à l'altitude du vol au-dessus du site traité. NE PAS appliquer en gouttelettes d'un diamètre inférieur au calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1). Réduire la dérive causée par les turbulences créées en bout d'aile de l'aéronef. La longueur occupée par les buses le long de la rampe de pulvérisation NE DOIT PAS dépasser 65 % de l'envergure des ailes ou du rotor.

Appliquer seulement ce produit avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les doses et instructions figurant sur l'étiquette.

Les doses, les conditions et les mises en garde indiquées sur l'étiquette sont spécifiques à ce produit. Lire toute l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. N'appliquer qu'à la dose recommandée sur l'étiquette pour les applications par voie aérienne. Si aucune dose n'est indiquée pour l'utilisation ou la culture visée, ce produit ne peut être utilisé, quel que soit le type d'équipement d'application par voie aérienne.

S'assurer que l'application est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit appliqué de façon inégale (application en bandes, irrégulière ou double), utiliser des marqueurs appropriés.

Application à l'aide d'un pulvérisateur agricole : NE PAS appliquer ce produit par calme plat ni lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer en gouttelettes d'un diamètre inférieur au calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1). La hauteur de la rampe de pulvérisation doit être fixée à 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.

Application à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique : NE PAS appliquer ce produit par calme plat ni lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS orienter le jet au-dessus des plantes à traiter. À l'extrémité des rangs et le long des rangs extérieurs, couper l'alimentation des buses pointant vers l'extérieur. NE PAS appliquer si la vitesse du vent excède 16 km/h au site de traitement du côté exposé au vent.

Zones tampons de pulvérisation :

Une zone tampon de pulvérisation N'EST PAS requise pour :

- les utilisations avec pulvérisateur manuel quand cela est permis sur l'étiquette.
- pulvérisateur à faible hauteur muni d'écrans ou de cônes antidérive qui assurent que la dérive de pulvérisation ne rentre pas en contact avec les fruits du verger, des cultures ou le feuillage.
- trempage du sol et incorporation au sol.

Il faut établir les zones tampons de pulvérisation indiquées ci-dessous entre le point d'application directe du produit et la limite sous le vent la plus rapprochée des habitats d'eau douce (lacs, rivières et ruisseaux, bourbiers, étangs, fondrières des Prairies, marais, réservoirs, milieux humides), des habitats estuariens et des habitats marins sensibles.

Méthode d'application	Culture		Zones tampons de pulvérisation (en mètres) requises pour la protection des :			
			habitats d'eau douce d'une profondeur de:		habitats estuariens ou marins d'une profondeur de:	
			moins de 1 m	plus de 1 m	moins de 1 m	plus de 1 m
Pulvérisateur agricole	Oignons (application foliaire), pommes de terre, betteraves à sucre		5	1	2	1
	Tomates de grande culture, cantaloups, concombres, melons, citrouilles, courges		5	1	3	1
	Ginseng		10	2	4	2
	Oignons (application dans la raie de semis)		15	1	5	3
Pulvérisateur pneumatique	Pommes	Début de croissance	45	25	35	25
		Fin de croissance	35	20	25	20
	Raisins	Début de croissance	40	20	30	20
		Fin de croissance	30	10	20	10
Aérienne	Pommes de terre	Voilure fixe	275	15	45	15
		Voilure tournante	150	10	35	10

Lorsque les mélanges en cuve sont permis, consulter l'étiquette des produits d'association et respecter la zone tampon de pulvérisation la plus vaste (la plus restrictive) parmi les zones tampons associées aux produits utilisés dans le mélange en cuve. Appliquer seulement en gouttelettes correspondant au plus gros calibre indiqué pour les produits utilisés dans le mélange selon les catégories de l'ASAE.

Il est possible de modifier les zones tampons de pulvérisation associées à ce produit selon les conditions météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le calculateur de zone tampon qui se trouve dans la section Pesticides du site Canada.ca

CULTURE	MALADIE SUPPRIMÉE	DOSE DE PRODUIT À EMPLOYER	MODE D'EMPLOI
Pommes	Rouille de Virginie (<i>Gymnosporangium</i>)	2 - 6 kg/ha (1,5 - 4,5 kg)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 7 jours.

	<i>juniperivirginianae</i> Rouille de coing (<i>Gymnosporangium clavipes</i> , Tavelure (<i>Venturia inaequalis</i>)	ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer conformément au calendrier de protection, du stade du point vert au second traitement postfloral. • Utiliser 5 kg/ha après le second traitement postfloral si le degré d'infestation par la tavelure est faible. • Ce fongicide peut causer des dommages à la Golden Delicious. • L'ajout d'un agent mouillant assurera une couverture plus uniforme et plus égale de votre produit de pulvérisation et permettra d'éviter la formation de résidus tachetés visibles.
	Tavelure (<i>Venturia inaequalis</i>)	3,6 kg/ha (2,7 kg ma/ha) MANZATE PRO-STICK + 190 g/ha VANGARD* 75WG Fongicide.	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 7 jours. • Appliquer entre le stade de la pointe verte et la postfloraison. • Lire et observer toutes les précautions indiquées sur l'étiquette du fongicide VANGARD 75 WG • Ne pas appliquer ce mélange par voie aérienne.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 24 kg/ha/an (18 kg ma/ha/an). • NE PAS appliquer plus de 6,0 kg/ha de fongicide Manzate Pro-Stick par application. • Ne pas appliquer plus de 12 applications par an à 2 kg/ha ou 8 applications à 3,0 kg/ha ou 4 applications par an 6,0 kg/ha. • Ne pas nourrir le bétail avec la pulpe des pommes traitées. • Ne pas faire paître le bétail dans les vergers traités. • Délai de sécurité (DS) pour taille des fruits à la main: 35 jours. • Délai de sécurité (DS) pour toutes les autres activités: 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 77 jours 			
Concombres de grande culture	Tache alternarienne (<i>Alternaria cucumerina</i>), Anthracnose (<i>Colletotrichum obiculare</i>), Mildiou duveteux (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Rouille des Tiges Gommeuses (<i>Didymella bryoniae</i>), Gale (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	2,25 - 3,25 kg/ha (1,69 - 2,44 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 7 jours. • Appliquer lorsque les plants commencent à courir sur le sol ou sont menacés par la maladie.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 9,75 kg/ha/an (7,32 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 3 applications par an. • Délai de sécurité (DS): 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 14 jours. 			
Ginseng	Brûlure alternarienne (<i>Alternaria panax</i>).	4,4 kg/ha (3,3 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 14 jours. • Utiliser le produit dès l'apparition de la maladie et répéter les pulvérisations à des intervalles de deux semaines dans le cadre d'un

			<p>programme de vaporisation normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer dans 2,000 litres d'eau.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 26,4 kg/ha/an (19,8 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 6 applications par an. • Ne pas donner du ginseng traité (racines ou feuilles) aux animaux. • Délai de sécurité (DS) pour activités liées à l'irrigation manuelle lors desquelles des travailleurs entrent en contact avec le feuillage : 1 jour. • Délai de sécurité (DS) pour toutes les autres activités: 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 30 jours. 			
Raisins	Pourriture noire (<i>Guignardia bidwellii</i>), Mildiou (<i>Plasmopara viticola</i>)	3,0 kg/ha (2,25 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Commencer les applications quand les nouvelles pousses ont 20 à 25 cm de long (avant la floraison).
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 3 kg/ha/an (2,25 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 1 application par an. • Délai de sécurité (DS) pour Incision annulaire, écimage-rognage : 21 jours. • Délai de sécurité (DS) pour effeuillage manuel, palissage, tuteurage : 7 jours. • Délai de sécurité (DS) pour activités liées à l'irrigation manuelle lors desquelles des travailleurs entrent en contact avec le feuillage : 1 jour. • Délai de sécurité (DS) pour toutes les autres activités: 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 66 jours. 			
Melons (cantaloup inclus, mais pastèque exclue), courges, et citrouilles	Tache alternarienne (<i>Alternaria cucumerina</i>). Anthracnose (<i>Colletotrichum obiculare</i>), Mildiou duveteux (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Rouille des Tiges Gommeuses (<i>Didymella bryoniae</i>), Gale (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	1,10 - 3,25 kg/ha (0,84-2,44 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 7 jours. • Appliquer dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture adéquate. • Commencer les applications lorsque les coulons commencent à se former ou dès les premiers signes de la maladie, et répéter toutes les semaines. • Pulvériser directement pour assurer la couverture totale des surfaces supérieures et inférieures des feuilles.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 9,75 kg/ha/an (7,31 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 3 applications par an. • Délai de sécurité (DS): 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 14 jours. 			
Oignons (bulbe sec) (application foliaire)	Brûlure des feuilles (<i>Botrytis squamosa</i>), Mildiou duveteux (<i>Peronospora destructor</i>), Pourriture du col (<i>Botrytis allii</i>), Tache pourpre (<i>Alternaria porri</i>)	2,25 kg/ha (1,69 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 7 jours. • Commencer les applications dès que l'on signale la maladie dans la région.
	Brûlure des feuilles (<i>Botrytis squamosa</i>), Mildiou duveteux (<i>Peronospora destructor</i>)	2,25 kg/ha (1,69 kg ma/ha) MANZATE PRO-STICK +	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle de 7 à 10 jours. • Il est suggéré d'ajouter un adjuvant ou surfactant non ionique afin d'augmenter l'efficacité du

		0,75 kg/ha ROVRAL WP ou ROVRAL WDG Fongicide.	fongicide. <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser ce mélange en cuve en traitement préventif. • Le traitement peut débuter vers la mi-juin ou lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. • Ne pas appliquer ce mélange en cuve moins de 15 jours avant la récolte. • Lire et observer toutes les précautions indiquées sur l'étiquette du Fongicide ROVRAL WP ou le fongicide ROVRAL WDG.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas traiter les bulbes à découvert. • Ne pas appliquer sur les oignons verts destinés à être mis en bottes. • Ne pas appliquer plus de 13,5 kg/ha/an (10,1 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 6 applications par an. • Délai de sécurité (DS) pour désherbage manuel : 1 jour. • Délai de sécurité (DS) pour toutes les autres activités: 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 14 jours. 			
Pommes de terre	Brûlure alternarienne (<i>Alternaria solani</i>), Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>)	1,1 - 2,25 kg/ha (0,83-1,69 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 5 jours. • Commencer les applications quand les plants ont atteint 10 à 15 cm de hauteur; répéter à intervalles de 5 jours • Commencer avec la dose la plus faible et augmenter jusqu'à la dose maximale à mesure que le feuillage se développe.
	Brûlure alternarienne (<i>Alternaria solani</i>), Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>)	1,75 – 2,25 kg/ha (1,31 – 1,69 kg ma/ha) MANZATE PRO-STICK + 0,80 – 1,6 kg/ha KOCIDE 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle de 7 à 10 jours. • Appliquer lorsque les plants atteignent 15 cm de hauteur et jusqu'à la récolte • Lire et observer toutes les précautions indiquées sur l'étiquette du fongicide KOCIDE 2000
	Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>)	1,35 – 1,6 kg/ha (1 – 1,2 kg ma/ha) MANZATE PRO-STICK + 225 g/ha CURZATE Fongicide	<ul style="list-style-type: none"> • Commencer le traitement lorsque les conditions locales laissent présager une infestation par le mildiou • Répéter les applications à intervalles de 5 à 7 jours. • Ne pas effectuer plus de 4 applications par culture. • Ne pas appliquer sur plus de 150 ha/jour. • Ne pas appliquer moins de 8 jours avant la récolte. • Utiliser un volume d'eau suffisant

			pour obtenir une couverture complète : 200 à 1 000 L/ha (minimum de 50 L / ha si l'application par voie aérienne).
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 18 kg/ha/an (13,5 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 8 applications par an. • Délai de sécurité (DS): 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 3 jours • L'application saisonnière totale combinée de mancozèbe et de métirame ne peut pas dépasser le nombre maximal d'applications sur les pommes de terre par année, dont au maximum trois (3) applications de métirame. 			
Betteraves à sucre	Tache cercosporéenne (<i>Cercospora beticola</i>)	2,25 kg/ha (1,69 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 7 jours. • Commencer les applications dès que la culture est menacée par la maladie.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 11,25 kg/ha/an (8,5 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 5 applications par an. • Ne pas manger ni donner aux animaux les parties aériennes traitées. • Délai de sécurité (DS): 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 21 jours. 			
Tomates de grande culture	Anthraxose (<i>Colletotrichum</i> spp), Brûlure alternarienne (<i>Alternaria solani</i>), Tache grise (<i>Stemphyllium</i>), Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>)	1,75 - 3,25 kg/ha (1,31 - 2,44 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à un intervalle minimum de 7 jours. • Commencer les applications dès que l'on signale la maladie dans la région. • Utiliser la dose de 1,75 kg/ha la plus faible sur les jeunes plants et la plus forte de 3,25 kg/ha sur les plants adultes.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 6,5 kg/ha/an (4,9 kg ma/ha/an). • Ne pas appliquer plus de 2 applications par an. • Délai de sécurité (DS): 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 30 jours. 			

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE L'ÉNONCÉ SUIVANT AVANT D'UTILISER LE PRÉSENT PRODUIT À DES FINS SPÉCIALES :

Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres que UPL AgroSolutions Canada Inc. dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, UPL AgroSolutions Canada Inc. n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) du produit et(ou) la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. L'utilisateur devrait d'abord essayer le produit sur une petite surface, dans les conditions du site et selon les pratiques habituelles, afin de confirmer que le produit convient à une application généralisée.

Bulbes d'oignons secs	Charbon de l'oignon (<i>Urocysti cepulae</i>)	4,4 – 8,8 kg/ha MANZATE PRO-STICK (3,3 – 6,6 kg ma/ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer en granules dans les sillons, au moment de l'ensemencement.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer plus de 1 application par an. • Délai de sécurité (DS): 12 heures. • Délai d'attente avant la récolte (DAAR): 100 jours. 			

GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance, MANZATE PRO-STICK fongicide du groupe M3. Toute population

fungique peut renfermer des individus naturellement résistants à MANZATE PRO-STICK et à d'autres fongicides du groupe M3. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance. Pour retarder l'acquisition de la résistance aux fongicides :

- Dans la mesure du possible, alterner le MANZATE PRO-STICK ou les fongicides du même groupe M3 avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des fongicides provenant d'un groupe différent et qui sont efficaces contre les pathogène cible, si cet emploi est permis.
- Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les maladies qui privilégie les inspections sur le terrain, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui prévoit l'acquisition d'une résistance chez les plantes hôtes, les répercussions des conditions environnementales sur l'apparition des maladies, les seuils déclencheurs de maladie de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique. Lorsque possible, utiliser des modèles de prévision des maladies afin d'appliquer les fongicides au moment propice.
- Surveiller les populations fongiques traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance. Informer UPL AgroSolutions Canada Inc. en présence d'une baisse possible de sensibilité au fongicide MANZATE PRO-STICK chez l'agent pathogène.
- Lorsque la maladie continue de progresser après traitement avec ce produit, ne pas augmenter la quantité utilisée. Cesser d'employer le produit et passer à un autre fongicide ayant un site ou un mode d'action différent, si possible.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local es interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée. Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à la compagnie UPL AgroSolutions Canada Inc. au 1-800-438-6071.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans son contenant d'origine, à l'écart des aliments pour les animaux ou les humains. Veiller à ce que le produit ne soit pas mouillé ou surchauffé pendant l'entreposage. Il peut être l'objet de modifications chimiques qui réduisent son efficacité en tant que fongicide et dégagent des vapeurs inflammables. Garder le contenant hermétiquement fermé.

ÉLIMINATION

1. Vider complètement le sac dans la cuve du pulvérisateur.
2. Rendre le sac inutilisable.
3. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale ou territoriale.
4. Pour obtenir des renseignements sur l'élimination du produit inutilisé ou superflu, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial ou territorial de réglementation responsable. En cas de déversement et de nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant et à l'organisme provincial ou territorial de réglementation responsable.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

UPL, le logo d'UPL, MANZATE et PRO-STICK sont des marques déposées d'une société du groupe UPL Corporation Limited.

©2021 Société du groupe UPL Corporation Limited