



6% CALCIUM OLIGO-CA^{MC}

CONTENU NET
23,10 Kilogrammes
(20 Litres)

ANALYSE MINIMUM GARANTIE
Calcium (Ca) 6%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

OLIGO-CA^{MC} 6% Calcium est assimilable par la plante, soit par les racines ou par le feuillage. Ce produit peut être utilisé sur toutes les cultures. L'utilisation de ce produit doit se faire sur recommandation d'analyse de sol ou de feuillage ou suite à l'apparition de symptômes de carence. Consultez votre agronome ou votre spécialiste local pour sélectionner le traitement le plus approprié. Les résidus dans le contenant sont normalement solubles à l'eau. Rincez et versez dans le pulvérisateur. Si le résidu est cristallisé, dissolvez complètement à l'eau chaude et versez dans le pulvérisateur.

TRAITEMENTS FOLIAIRES

Afin d'obtenir un rendement optimal, traitez dès le début de la saison. Traitez lorsque la plante est en pleine croissance. Pulvérisez tôt le matin, en fin d'après-midi ou par temps couvert. Pour les pulvérisations foliaires, utilisez entre 200 et 500 litres (L) d'eau par hectare (ha). Avec les pulvérisateurs à faible débit, utilisez au moins 50 litres d'eau/ha. Si la bouillie est trop concentrée, de légères lésions sur le feuillage peuvent survenir. Pour les pulvérisations aériennes, ne pas utiliser plus de un (1) litre de ce produit pour chaque quatre (4) litres d'eau.

TAUX D'APPLICATION

N.B. : Les pulvérisations foliaires avec ce produit ne peuvent être substituées aux applications de calcium au sol. Elles sont plutôt un supplément ou une mesure pour corriger les carences de calcium temporaires qui affectent la plupart des cultures.

Recommandation Générale

Appliquez de 3 à 6 L/ha et répétez au besoin.

Arbres Fruitiers

Appliquez de 3 à 6 L/ha à des intervalles de 7 à 14 jours à partir du calice jusqu'à la formation complète des fruits.

Légumes

- 1) **Carottes** : Appliquez de 3 à 6 L/ha quand les carottes ont atteint le tiers de leurs croissances et répétez de 2 à 3 fois à un intervalle de 2 semaines.
- 2) **Céleri** : Appliquez de 3 à 6 L/ha quand le céleri a 20 centimètres de hauteur et répétez à tous les 7 à 10 jours.
- 3) **Tomates** : Appliquez de 3 à 6 L/ha à la formation des premiers fruits et répétez à tous les 7 à 10 jours.

MISE EN GARDE : Ce produit doit être utilisé selon les recommandations. Il peut s'avérer dangereux s'il est mal utilisé. Gardez hors de la portée des enfants.

PROTECTION PERSONNELLE

Évitez tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements en portant des lunettes et des vêtements de protection.

PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX : Enlevez les lentilles cornéennes. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau courante en tenant les paupières ouvertes. Consultez un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU : Lavez à grande eau avec du savon. Lavez les vêtements contaminés avant de les remettre.

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR. Si la victime est consciente et alerte, rincez la bouche avec de l'eau et faites boire un verre d'eau ou de lait pour diluer le produit.

OBTENEZ UNE ASSISTANCE MÉDICALE IMMÉDIATEMENT. Si des vomissements spontanés surviennent, inclinez la tête de la victime vers le bas pour lui éviter d'avaler les vomissures. Rincez la bouche et faites boire un verre d'eau ou de lait.

ENTREPOSAGE

Gardez ce produit à une température supérieure à 0°C. Les contenants ne devraient pas être empilés plus de quatre (4) de haut avec une palette entre le 2ème et le 3ème rang.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS

Rincer les contenants trois (3) fois et éliminer conformément aux réglementations municipales / provinciales / fédérales ou recycler.

CONDITION DE VENTE

Le vendeur garantit que ce produit est conforme aux informations de l'étiquette et est, d'une manière raisonnable, propre aux usages mentionnés sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé selon les directives et dans des conditions normales d'utilisation. Personne, autre que le représentant du vendeur, n'est autorisé à donner des garanties ou directives concernant ce produit.



AXTER
Agroscience inc.

895, Chemin Benoît
Mont-St-Hilaire
Québec J3G 4S6