

GROUPE

40

FONGICIDE

FONGICIDE FORUM

Fongicide pour utilisation dans les légumes du genre brassicacées, végétaux à bulbe, les cucurbitacées, légumes à fruits, ginseng, raisins, houblon, légumes à feuilles, les cultures de pomme de terre et les plantes ornementales en serre et à l'extérieur.

NE PAS appliquer sur des fleurs coupées ou les légumes cultivés en serre

USAGE AGRICOLE

SUSPENSION CONCENTRÉE

GARANTIE : diméthomorphe 500 g/L

NO. D'ENREGISTREMENT : 32026 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Contient du 1,2-benzisothiazoline-3-one à raison de 0,0212% à titre d'agent de conservation

CONTENU NET : 0,1 ou Vrac

AVERTISSEMENT POISON



GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT

EN CAS D'URGENCE ASSOCIÉE À CE PRODUIT ET METTANT EN DANGER
LA VIE OU DES BIENS, TÉLÉPHONEZ LE JOUR OU LA NUIT
AU 1-800-454-2673

BASF Canada Inc.
100 Milverton Drive
5^e étage
Mississauga, Ontario
L5R 4H1
1-877-371-2273

FORUM est une marque déposée de BASF Corporation, utilisée avec permission par BASF Canada Inc.

PRÉCAUTIONS

1. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
2. Les travailleurs doivent en tout temps porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des gants et des bottes résistant aux produits chimiques. Ils doivent aussi porter une combinaison et des lunettes de sécurité ou un écran facial lors du mélange et du chargement du produit et lors des activités de nettoyage et de réparation. Si on utilise un équipement manuel à faible pression, les préposés au mélange, au chargement et à l'application doivent aussi porter une combinaison et des gants résistant aux produits chimiques.
3. Se laver les mains avant de manger, boire, fumer ou d'utiliser la toilette. Changer les vêtements de travail et prendre un bain ou une douche après la manipulation ou la pulvérisation du produit. Laver les vêtements de protection avant de les réutiliser.
4. Pour les pommes de terre, les plantes ornementales en serre et à l'extérieur et les légumes à fruits, ne pas pénétrer dans les zones traitées dans les 12 heures après l'application. Pour toutes les autres cultures veuillez consulter le Tableau spécifique des doses d'application pour la période de retrait.
5. Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive est à son minimum vers les zones habitées ou des secteurs d'activité humaine où l'on retrouve des demeures, maisons de campagne, écoles et des superficies consacrées aux loisirs. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, les inversions de température, l'équipement d'application et les ajustements du pulvérisateur.
6. Nettoyer l'équipement de pulvérisation soigneusement après l'usage.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Il n'existe aucun antidote spécifique. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

Garder en lieu sûr, dans un endroit frais, sec et bien ventilé, loin de tout aliment destiné à la consommation humaine ou animale et hors de la portée des enfants.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

MODE D'EMPLOI

Le **fongicide FORUM** offre un effet protectant, systémique et anti-sporulant contre les maladies dans les cultures énumérées sur l'étiquette.

Pour retirer tous les avantages de l'application foliaire du **Fongicide FORUM** il doit y avoir un recouvrement complet de la plante.

NE PAS appliquer sur des plantes cultivées pour produire des fleurs coupées ou vendues en tant que celles-ci.

NE PAS utiliser sur des paysages résidentiels, commerciaux ou industriels.

NE PAS utiliser de l'équipement manuel à haute pression pour appliquer le **fongicide FORUM**.

NE PAS utiliser un pulvérisateur à dos pour appliquer le **fongicide FORUM**.

NE PAS semer une nouvelle culture dans la zone traitée dans les 30 jours après la dernière application.

NE PAS appliquer sur les légumes en serre.

Lorsque vous utilisez un produit d'association dans le mélange en réservoir, respectez toutes consignes dans le mode d'emploi, cultures/sites, doses appliquées, précautions, EPP et les restrictions qui apparaissent sur l'étiquette du produit mélangé en réservoir. Les précautions et restrictions les plus sévères retrouvées sur les étiquettes doivent être respectées.

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre les organismes nuisibles en milieux aquatiques.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

TOXIQUE pour les organismes aquatiques. Respecter les zones tampons spécifiées dans la section MODE D'EMPLOI.

NE PAS contaminer l'eau d'irrigation ou l'approvisionnement en eau potable ou les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

Pour réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer lorsque de fortes pluies sont prévues.

La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation entre le site traité et le bord du plan d'eau.

Tableau de la dose d'application pour la pomme de terre

Culture	Maladies	Taux d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'application par saison
Pommes de terre	Mildiou Pourriture des tubercules* (<i>Phytophthora infestans</i>)	450 mL produit/hectare (225 g m.a./hectare), dans un mélange en réservoir avec POLYRAM ^{MD} DF OU Dithane ^{MC} DG Rainshield ^{MC} OU Bravo ^{MD} 500, à la dose de produit recommandée sur l'étiquette	4	3

*Lorsqu'utilisé conformément aux directives de l'étiquette, le fongicide FORUM réduit aussi la pourriture des tubercules. Le fongicide FORUM ne supprime pas la brûlure alternarienne. Dans le but de réduire le risque de développement de résistance au fongicide, le fongicide FORUM doit être utilisé en mélange en réservoir avec d'autres fongicides.

Taux d'application

NE PAS appliquer le fongicide FORUM seul. Le fongicide FORUM doit être mélangé en réservoir avec l'un des fongicides suivants : POLYRAM DF, Dithane DG Rainshield ou Bravo 500. Appliquez le **fongicide FORUM** à une dose de 450 mL produit/hectare (225 g m.a./hectare), dans un mélange en réservoir avec POLYRAM DF ou Dithane DG Rainshield ou Bravo 500, à la dose de produit recommandée sur l'étiquette.

Consulter l'étiquette respective du produit d'association en réservoir pour des recommandations, restrictions et précautions supplémentaires. Respecter les directives les plus strictes de chacun des produits d'association mélangés en réservoir se rapportant au nombre maximal d'applications, la période d'application et l'IAR.

Le volume d'eau à utiliser devra varier en fonction de la croissance des plantes. Utiliser suffisamment d'eau pour obtenir une couverture adéquate. Les volumes de pulvérisation peuvent varier de 50 à 100 L/ha pour les bouillies concentrées et de 225 à 1600 L/ha pour les bouillies diluées.

Période d'application

Pour protéger les cultures contre le mildiou, utiliser le **fongicide FORUM** comme protectant. Effectuer la première application lorsque la maladie menace les cultures ou lorsque les premiers signes de maladie apparaissent dans les champs ou à proximité. Appliquer à intervalles de 5 à 7 jours (risques élevés d'infestation) ou de 7 à 10 jours (faible risques d'infestation). Il est recommandé d'appliquer le **fongicide FORUM** en rotation avec un fongicide ayant un autre mode d'action. Dans des conditions d'infection sévères par le mildiou, appliquer le **fongicide FORUM** après le défanage afin de réduire la pourriture des tubercules.

NE PAS semer une nouvelle culture dans la zone traitée moins de 30 jours après la dernière application.

Un intervalle minimum de 5 jours entre les applications est requis.

Tableau de la dose d'application pour les plantes ornementales en serre

Culture	Maladies	Taux d'application (mL/100 L) Taux maximum par hectare par saison
<p><u>Les plantes ornementales en serre</u> incluant :</p> <p>Azalée, bégonia, chrysanthème, cordyline, œillet, dieffenbachia, ficus, géranium, gerbera, ibéris impatiente, lisianthus, pensée, pervenche, violette persienne, phlox, primevère, rose (hybride thé, miniature), spathiphyllum, stockésie, verveine et violette.</p> <p>Le fongicide FORUM peut être appliqué sur les cultures suivantes: violette africaine, cinéraire argentée, alysse maritime et muflier peuvent montrer un léger retard de croissance ou des symptômes phytotoxiques après des applications répétées.</p>	<p>Le mildiou causé par <i>Peronospora parasitica</i>, <i>P. Violae</i>, <i>P. sparsa</i>, <i>P. Antirrhini</i> et <i>P. phlogina</i></p>	<p>48 mL/ 100 litres</p>
<p>Appliquer jusqu'à l'égouttement pour assurer un recouvrement complet des fleurs, du feuillage et des tiges. Employer un traitement de pleine surface à des intervalles de 7 à 14 jours tout au long du cycle de production. Le Fongicide FORUM pour être efficace, DOIT ÊTRE appliqué en prévention avant que les symptômes de maladie deviennent évidents.</p> <p>NE PAS effectuer plus de 4 applications par saison.</p> <p>NE PAS faire plus de 2 applications consécutives avant de faire une rotation avec un fongicide ayant un mode d'action alternatif.</p> <p>NE PAS appliquer sur les fleurs coupées cultivées en serre.</p> <p>En raison du grand nombre d'espèces et variétés/cultivars, les utilisateurs devraient effectuer des tests à petite échelle sous des conditions locales avant un emploi plus généralisé.</p>		

Plantes ornementales, herbacées vivaces et annuelles cultivées à l'extérieur
Tableau des doses d'application

Culture	Maladies	Taux d'application (mL/100 L)
Plantes ornementales, herbacées vivaces et annuelles cultivées à l'extérieur	Le mildiou causé par <i>Peronospora parasitica</i> , <i>P. Violae</i> , <i>P. sparsa</i> , <i>P. Antirrhini</i> et <i>P. phlogina</i>	48 mL/100 L (ne doit pas dépasser 450 mL/ha OU 225 g m.a./ha)
<p>Effectuez une application foliaire du Fongicide FORUM à une dose de 450 mL produit/ha dans un volume minimal d'eau de 200 L/ha, jusqu'au ruissellement. Effectuez 4 applications au maximum par saison de culture à des intervalles de 7 à 14 jours. Ne pas faire plus de 2 applications consécutives avant de faire une rotation avec un fongicide ayant un mode d'action différent et homologué pour supprimer le mildiou. Le Fongicide FORUM pour être efficace, doit être appliqué de façon préventive avant que les symptômes deviennent évidents. Effectuez la première application lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie.</p> <p>Note : Certaines espèces n'ont pas fait l'objet de tests de phytotoxicité. Un petit groupe de chaque espèce devrait être évalué avant d'appliquer sur l'ensemble de la culture.</p>		

Plantes ornementales cultivées à l'extérieur en contenants et en champ (incluant les conifères) dans les pépinières et les plantations d'aménagement
Tableau des doses d'application

Culture	Maladies	Taux d'application (mL/100 L)
Plantes ornementales cultivées à l'extérieur en contenants et en champ (incluant les conifères) dans les pépinières et les plantations d'aménagement	Répression de l'encre des chênes rouges * (<i>Phytophthora ramorum</i>)	48 mL/100 L (ne doit pas dépasser 450 mL/ha OU 225 g m.a./ha)
<p>Effectuez une application foliaire du Fongicide FORUM à une dose de 450 mL produit/ha dans un volume minimal d'eau de 200 L/ha, jusqu'au ruissellement. Effectuez 4 applications au maximum par saison de culture à des intervalles de 10 à 14 jours. Ne pas faire plus de 2 applications consécutives avant de faire une rotation avec un fongicide ayant un mode d'action différent et homologué pour réprimer l'encre des chênes rouges. Le Fongicide FORUM pour être efficace, doit être appliqué de façon préventive avant que les symptômes deviennent évidents. Effectuez la première application lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie.</p> <p>*Pour la répression de l'encre des chênes rouges causée par <i>Phytophthora ramorum</i> sur ces plantes ornementales jugées sensibles à cette maladie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Pour une liste complète des espèces ornementales, consultez la publication "Liste des genres réglementés à l'égard du <i>Phytophthora ramorum</i> (Encre des chênes rouges)", qui est mise à jour régulièrement sur le site : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/protect/dir/sodspf.shtml.</p> <p>Note : Certaines espèces n'ont pas fait l'objet de tests de phytotoxicité. Un petit groupe de chaque espèce devrait être évalué avant d'appliquer sur l'ensemble de la culture.</p>		

**Tableau de la dose d'application pour les légumes de la famille des brassicacées
(Application terrestre et aérienne)**

Cultures	Maladies	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre Maximal d'applications par saison
<p><u>Légumes brassicacées :</u> Brocoli Brocoli de Chine (gai lon) Chou Chou de Bruxelles Chou, chinois (pé-tsaï) Chou, chinois (gai choy) Chou-fleur Chou brocoli Chou-rave</p>	<p>Répression de mildiou seulement (<i>Peronospora parasitica</i>)</p>	<p>450 mL produit par hectare</p>	<p>7</p>	<p>5</p>
<p>Le fongicide FORUM doit être utilisé dans un mélange en réservoir avec un autre fongicide pour être efficace contre le mildiou.</p> <p>Débuter les applications lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Poursuivre les traitements à des intervalles de 7 jours aussi longtemps que les conditions sont favorables à l'infection et jusqu'à ce que la sporulation diminue.</p> <p>NE PAS utiliser moins de 200 litres d'eau à l'hectare pour les applications terrestres et 20 litres à l'hectare pour les applications aériennes.</p> <p>Consultez les recommandations du système d'avertissement phytosanitaire local pour déterminer les niveaux de pression de maladie prévus et l'intervalle d'application approprié. Effectuez le traitement de façon à obtenir un recouvrement complet et uniforme de la plante.</p> <p>Gestion de la Résistance</p> <p>Ne pas faire plus de deux applications consécutives du fongicide FORUM avant de faire un changement pour un autre fongicide ayant un mode d'action différent de celui du fongicide FORUM pour au moins un traitement.</p> <p>Application terrestre: Ne pas manipuler plus de 81 L de produit par jour.</p> <p>Ne pas pénétrer dans les zones traitées pour une récolte manuelle ou l'irrigation dans les 7 jours après l'application, ou pour un dépistage dans les 5 jours après l'application. Pour toute autre activité dans les légumes de la famille des brassicacées, ne pas entrer dans les zones traitées moins de 12 heures après l'application.</p>				

**Tableau de la dose d'application pour les végétaux à bulbe
(Application terrestre et aérienne)**

Culture	Maladie	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'applications par saison
<u>Légumes à bulbes :</u> Ail Rocambule Poireau Oignon, bulbe sec Oignon, vert Ciboule Échalote	Répression de mildiou (<i>Peronospora destructor</i>)	450 mL produit par hectare	0	5

Le fongicide FORUM doit être utilisé dans un mélange en réservoir avec un autre fongicide pour être efficace contre le mildiou.

Débuter les applications lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Poursuivre les traitements à des intervalles de 5 à 7 jours aussi longtemps que les conditions sont favorables à l'infection et jusqu'à ce que la sporulation diminue.

NE PAS utiliser moins de 200 litres d'eau à l'hectare pour les applications terrestres et 20 litres à l'hectare pour les applications aériennes.

Consultez les recommandations du système d'avertissement phytosanitaire local pour déterminer les niveaux de pression de maladie prévus et l'intervalle d'application approprié. Effectuez le traitement de façon à obtenir un recouvrement complet et uniforme de la plante.

Gestion de la Résistance

Ne pas faire plus de deux applications consécutives du **fongicide FORUM** avant de faire un changement avec un fongicide ayant un mode d'action différent de celui du **fongicide FORUM** pour au moins un traitement.

Application terrestre: Ne pas manipuler plus de 81 L de produit par jour.

Ne pas pénétrer dans les zones traitées pour une récolte manuelle des oignons verts ou l'éclaircissage de toutes autres cultures dans les 2 jours après l'application. Pour toute autre activité dans les légumes à bulbe, ne pas entrer dans les zones traitées moins de 12 heures après l'application.

**Tableau de la dose d'application pour les légumes de la famille des cucurbitacées
(Application terrestre et aérienne)**

Culture	Maladie	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'applications par saison
<p><u>Légumes cucurbitacées - comprend tous les types et hybrides de :</u> Cantaloup Courge cireuse Citrouille Concombre Gourde comestible Concombre des antilles Melon véritable Pastèque à confire Courge d'été Pastèque Courge d'hiver Courgette <i>Momordique</i> (tel que : pomme de merveille, margose amère, margose à piquants, Concombre chinois)</p>	<p>Mildiou (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) - Répression seulement</p>	450 mL produit par hectare	2	5

Le **fongicide FORUM** doit être utilisé dans un mélange en réservoir avec un autre fongicide pour être efficace contre le mildiou.

Débuter les applications lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Pour suivre les traitements à des intervalles de 5 à 10 jours. Utilisez l'intervalle le plus court lorsque la pression de maladie est élevée.

NE PAS utiliser moins de 200 litres d'eau à l'hectare pour les applications terrestres et 20 litres à l'hectare pour les applications aériennes.

Consultez les recommandations du système d'avertissement phytosanitaire local pour déterminer les niveaux de pression de maladie prévus et l'intervalle d'application approprié. Effectuez le traitement de façon à obtenir un recouvrement complet et uniforme de la plante.

Gestion de la Résistance

Ne pas faire plus de deux applications consécutives du **fongicide FORUM** avant de faire un changement avec un fongicide ayant un mode d'action différent de celui du **fongicide FORUM** pour au moins un traitement.

Application terrestre: Ne pas manipuler plus de 81 L de produit par jour.

Ne pas pénétrer dans les zones traitées pour une récolte manuelle, l'élagage ou l'éclaircissage dans les 2 jours après l'application. Pour toute autre activité dans les légumes de la famille des cucurbitacées, ne pas entrer dans les zones traitées moins de 12 heures après l'application.

Tableau de la dose d'application des légumes à fruits (Application terrestre et aérienne)

Culture	Maladie	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'applications par saison
<u>Groupe légumes à fruits :</u> Tomate Aubergine Cerise de terre (<i>Physalis spp</i>) Pépino Piment (toutes les variétés) Tomatille	Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>)	450 mL produit par hectare	0	5
<p>Le fongicide FORUM doit être utilisé comme un mélange en réservoir avec un autre fongicide pour être efficace contre le mildiou.</p> <p>Débuter les applications lorsque les plantes ont 46 pouces de hauteur et avant le début de l'infection de la maladie. Traitez selon un calendrier d'applications avec un intervalle de 5 à 10 jours. Appliquez aux 7 à 10 jours avant que les conditions deviennent favorables au développement de la maladie. Lorsque les conditions ont été favorables à la maladie ou bien que la maladie a été dépistée dans le champ ou à proximité, un intervalle de 5 à 7 jours est recommandé.</p> <p>Application terrestre: Ne pas manipuler plus de 81 L de produit par jour.</p>				
Culture	Maladie	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'applications par saison
Piment (toutes les variétés)	Brûlure phytophthoréenne (<i>Phytophthora capsici</i>) - répression	450 mL produit par hectare	0	2
<p>Débuter les applications lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Les applications devraient être effectuées à des intervalles de 5 à 7 jours lorsque la pression de maladie est forte et à des intervalles de 7 à 10 jours lorsque la pression de maladie est faible à modérée.</p> <p>NE PAS faire plus de deux applications par saison. NE PAS dépasser 900 mL par hectare par saison de croissance.</p> <p>NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.</p>				
<p>Toutes Cultures NE PAS utiliser moins de 200 litres d'eau à l'hectare pour les applications terrestres et 20 litres à l'hectare pour les applications aériennes.</p> <p>Consultez les recommandations du système d'avertissement phytosanitaire local pour déterminer les niveaux de pression de maladie prévus et l'intervalle d'application approprié. Effectuez le traitement de façon à obtenir un recouvrement complet et uniforme de la plante.</p> <p>Gestion de la Résistance Ne pas faire plus de deux applications consécutives du fongicide FORUM avant de faire un changement avec un fongicide ayant un mode d'action différent de celui du fongicide FORUM pour au moins un traitement.</p>				

Tableau de la dose d'application pour les raisins de table (Application à jet porté)

Culture	Maladie	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'applications par saison
Raisins	Mildiou (<i>Plasmopara viticola</i>)	450 mL produit par hectare	14	4

Le fongicide FORUM doit être utilisé dans un mélange en réservoir avec un autre fongicide pour être efficace contre le mildiou.

Dans le but de réduire le risque de développement de résistance au fongicide, le **fongicide FORUM** doit être utilisé en rotation avec d'autres fongicides efficaces contre le mildiou.

Débuter les applications avec le **fongicide FORUM** avant le développement de la maladie et Poursuivre les traitements à des intervalles de 7 à 10 jours. Utilisez l'intervalle le plus court lorsque la pression de maladie est forte.

NE PAS utiliser moins de 200 litres d'eau à l'hectare.

Consultez les recommandations du système d'avertissement phytosanitaire local pour déterminer les niveaux de pression de maladie prévus et l'intervalle d'application approprié. Effectuez le traitement de façon à obtenir un recouvrement complet et uniforme de la plante.

Gestion de la Résistance

Ne pas faire plus de deux applications consécutives du **fongicide FORUM** avant de faire un changement avec un fongicide ayant un mode d'action différent de celui du **fongicide FORUM** pour au moins un traitement.

Ne pas pénétrer dans les zones traitées pour pratiquer une incision annulaire dans les 19 jours après l'application ou pour la formation, éclaircissage ou élagage manuel dans les 12 jours après l'application. Pour toute autre activité dans les raisins, ne pas entrer dans les zones traitées moins de 12 heures après l'application.

Tableau de la dose d'application de houblon (Application à jet porté)

Culture	Maladie	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'applications par saison
Houblon	Répression de mildiou (<i>Pseudoperonospora umuli</i>)	450 mL produit par hectare	7	3

Le fongicide FORUM doit être utilisé comme un mélange en réservoir avec un autre fongicide pour être efficace contre le mildiou.

Utilisez le **fongicide FORUM** comme traitement foliaire préventif avant que l'infection débute. L'intervalle d'application pour le **fongicide FORUM** est de 10 jours.

NE PAS utiliser moins de 200 litres d'eau à l'hectare.

Consultez les recommandations du système d'avertissement phytosanitaire local pour déterminer les niveaux de pression de maladie prévus et l'intervalle d'application approprié. Effectuez le traitement de façon à obtenir un recouvrement complet et uniforme de la plante.

Gestion de la Résistance

Ne pas faire plus de deux applications consécutives du **fongicide FORUM** avant de faire un **changement avec un** fongicide ayant un mode d'action différent de celui du **fongicide FORUM** pour au moins un traitement.

Ne pas pénétrer dans les zones traitées pour une récolte manuelle, la formation ou l'effeuillage dans les 18 jours après l'application. Pour toute autre activité dans le houblon, ne pas entrer dans les zones traitées moins de 12 heures après l'application.

**Tableau de la dose d'application pour les légumes à feuilles
(Application terrestre et aérienne)**

Culture	Maladie	Dose d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'applications par saison
Légumes à feuilles : Laitue (pommée et frisée)	Répression de mildiou (<i>Bremia/actuae</i>) (<i>Peronospora spp.</i>)	450 mL produit par hectare	0	5
<p>Le fongicide FORUM doit être utilisé comme un mélange en réservoir avec un autre fongicide pour être efficace contre le mildiou.</p> <p>Débuter les applications lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Poursuivre les traitements à des intervalles de 5 à 10 jours. Utilisez l'intervalle le plus court lorsque la pression de maladie est forte.</p> <p>NE PAS utiliser moins de 200 litres d'eau à l'hectare pour les applications terrestres et 20 litres à l'hectare pour les applications aériennes.</p> <p>Consultez les recommandations du système d'avertissement phytosanitaire local pour déterminer les niveaux de pression de maladie prévus et l'intervalle d'application approprié. Effectuez le traitement de façon à obtenir un recouvrement complet et uniforme de la plante.</p> <p>Gestion de la Résistance Ne pas faire plus de deux applications consécutives du fongicide FORUM avant de faire un changement avec un fongicide ayant un mode d'action différent de celui du fongicide FORUM pour au moins un traitement.</p> <p>Application terrestre: Ne pas manipuler plus de 81 L de produit par jour.</p> <p>Ne pas pénétrer dans les zones traitées pour une récolte manuelle dans les 2 jours après l'application. Pour toute autre activité dans les légumes à feuilles, ne pas entrer dans les zones traitées moins de 12 heures après l'application.</p>				

Tableau de la dose d'application de ginseng

AVIS À L'UTILISATEUR

Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que BASF Canada et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. BASF Canada ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager BASF Canada de toute responsabilité liée à des réclamations relative à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits ci-dessous.

Culture	Maladies	Taux d'application (mL/ha)	IAR (jours)	Nombre maximal d'application par saison
Ginseng	Pourriture phytophtoréenne (<i>Phytophthora cactorum</i>)	450 mL produit/ hectare	30	3

Le **fongicide FORUM** fournira une répression du pourridié phytophtoréen sur le ginseng lorsqu'utilisé de façon préventive en association avec d'autres fongicides efficaces contre ce pathogène.

Dans le but de réduire le risque de développement de la résistance au fongicide **FORUM**, il **DOIT** être employé comme mélange en réservoir avec le fongicide Dithane^{MC} DG Rainshield^{MC} NT, le fongicide Manzate Pro-Stick^{MC} ou le fongicide Penncozebe^{MD} 75DF Raincoat à une dose de 3,3 kg de macozèbe/ha. Consulter l'étiquette respective du produit d'association en réservoir pour des recommandations, restrictions et précautions supplémentaires. Respecter les directives les plus strictes de chacun des produits d'association mélangés en réservoir se rapportant au nombre maximal d'applications, la période d'application et l'IAR.

Utilisez 2000 L/ha d'eau et assurez un bon recouvrement.

NE PAS effectuer plus de 3 applications par saison.

Période d'application

Afin de protéger les cultures contre le pourridié phytophtoréen, utilisez le fongicide **FORUM** comme protectant. Effectuez la première application lorsque les conditions sont idéales pour le développement de la maladie à l'intérieur du champ ou à proximité mais avant que les symptômes soient apparus dans le champ. Appliquez tous les 5 à 7 jours lorsque la pression de la maladie est forte ou aux 7 à 10 jours lors d'une pression de maladie plus faible.

Ne pas retourner dans le lieu traité ni autoriser un travailleur à le faire pendant le délai de sécurité (DS) de 12 heures.

APPLICATION PAR PULVÉRISATEUR DE CHAMP

NE PAS appliquer pendant des périodes de calme plat. Éviter l'application de ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** appliquer de gouttelettes plus petites que la classification moyenne de l'ASAE (American Society of Agricultural Engineers). La hauteur de la rampe doit être de 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.

APPLICATION À JET PORTÉ

NE PAS appliquer lors de périodes de calme plat. Évitez l'application de ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** pulvériser directement au-dessus des plants à traiter. Fermer les buses pulvérisant vers l'extérieur au bout des rangs et vers les rangées plus éloignées. **NE PAS** appliquer lorsque le vent souffle à plus de 16 km/h sur le site d'application tel que mesuré à l'extérieur de la zone de traitement sous le vent.

APPLICATION AÉRIENNE

NE PAS appliquer pendant des périodes de calme plat. Éviter l'application de ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** appliquer lorsque la vitesse du vent est supérieure à 16 km/h à hauteur de vol au-dessus du site d'application. **NE PAS** appliquer de gouttelettes plus petites que la classification moyenne de l'ASAE. Pour réduire la dérive causée par les vortex aux extrémités des ailes, **NE PAS** permettre d'espacement de buses le long de la rampe de plus de 65 % de l'envergure des ailes ou du rotor.

Avant d'effectuer l'application par voie aérienne, vérifier l'avion pour s'assurer de l'uniformité de la forme de dispersion du jet, de la largeur de pulvérisation et du débit. Il est généralement recommandé d'utiliser un volume de pulvérisation de 50 litres/ha. Si le feuillage est dense, utiliser un débit suffisant pour permettre une pénétration optimale du fongicide. Marquer la largeur de pulvérisation soit à l'aide de signaleurs qui travaillent dans des véhicules totalement clos, soit en comptant les rangs, en utilisant d'autres types de marques. **NE PAS** appliquer s'il y a risque de pluie dans les 2 à 3 heures suivant l'application. Appliquer sur le feuillage sec.

Épandre seulement avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur l'étiquette.

Les précautions à prendre ainsi que les directives et taux d'épandage à respecter sont propres au produit. Lire attentivement l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Utiliser seulement les quantités recommandées pour l'épandage aérien qui sont indiquées sur l'étiquette. Si, pour l'utilisation prévue du produit, aucun taux d'épandage aérien ne figure sur l'étiquette, on ne peut utiliser ce produit, et ce, quel que soit le type d'appareil aérien disponible.

S'assurer que l'épandage est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés.

Mises en garde concernant l'utilisation

Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables spécifiques à l'épandage aérien décrites dans le Guide national d'apprentissage – Application de pesticides par

aéronef, développé par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides doivent être présentes.

Mises en garde concernant l'opérateur antiparasitaire

Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques pré-mélangés contenus dans un système fermé.

Il serait préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'épandage.

Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter des gants, une combinaison et des lunettes ou un masque les protégeant contre les produits chimiques durant le mélange des produits, le chargement, le nettoyage et les réparations. Lorsque les précautions qu'on recommande à l'opérateur de prendre sont plus strictes que les recommandations générales qui figurent sur les étiquettes pour épandage avec pulvérisateur terrestre, suivre les précautions les plus rigoureuses.

Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.

Lire attentivement l'étiquette au complet et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler le fabricant en composant le 1-877-371-BASF (2273). Pour obtenir des conseils techniques, contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial.

ZONES TAMPONS

Les zones tampons indiquées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le point d'application directe et la limite la plus proche en aval des habitats d'eau douce sensibles (tels que les lacs, rivières, bourbiers, étangs, fondrières des Prairies, criques, marais, ruisseaux, réservoirs et terres humides) et les habitats estuariens/marins.

L'utilisation des méthodes ou de l'équipement suivant **NE nécessite PAS** de zone tampon : pulvérisateur manuel et traitement localisé.

Méthode d'application	Culture	Zones tampons (mètres) requises pour la protection de:			
		Habitats d'eau douce d'une profondeur de:		Habitats estuarien/marin d'une profondeur de:	
		Moins de 1 m	Plus de 1 m	Moins de 1 m	Plus de 1 m
Pulvérisateur de champ	Légumes de la famille des brassicacées et cucurbitacées, légumes à bulbe, à feuilles, à fruits, piment, pommes de terre, plantes ornementales à l'extérieur, ginseng	1	0	1	0

Méthode d'application	Culture		Zones tampons (mètres) requises pour la protection de:			
			Habitats d'eau douce d'une profondeur de:		Habitats estuarien/marin d'une profondeur de:	
			Moins de 1 m	Plus de 1 m	Moins de 1 m	Plus de 1 m
A jet porté	Raisins, houblon	Stade de croissance précoce OU tardive	1	0	1	0
Aérienne	Légumes de la famille des brassicacées et cucurbitacées, légumes à bulbe, à feuilles, à fruits et pommes de terre	Ailes fixes OU rotatives	1	0	1	0

Lorsqu'un mélange en réservoir est utilisé, lire les étiquettes des produits d'association et respecter la zone tampon la plus grande (la plus restrictive) des produits utilisés dans le mélange; utiliser les gouttelettes les plus grosses possibles (catégories de l'ASAE) recommandées dans les étiquettes des produits utilisés dans le mélange.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Il est reconnu que les agents pathogènes responsables de certaines maladies des plantes peuvent développer une résistance lorsqu'exposés à un type de produit ou même à des produits de famille chimique voisine. L'application de bonnes pratiques de gestion permettra de minimiser les risques d'apparition d'une résistance. Il est recommandé d'utiliser des pratiques culturales qui favorisent la diminution des sources de la maladie, et d'effectuer des applications hâtives de fongicides à titre préventif. Consulter le service local de renseignements agricoles pour connaître les conditions phytosanitaires et les mesures additionnelles de lutte intégrée recommandées pour votre région.

Pour ce qui est de la gestion de la résistance, le **fongicide FORUM** fait partie du groupe 40. Toute population fongique peut renfermer des individus naturellement résistants au **fongicide FORUM**. Les individus résistants peuvent finir par dominer au sein de la population fongique si ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux fongicides:

- Éviter d'effectuer plus de deux pulvérisations consécutives du **fongicide FORUM** ou d'autres fongicides du même groupe pendant une saison.
- Utiliser des mélanges en réservoir contenant des fongicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.

- Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les maladies qui privilégie les inspections sur le terrain, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui prévoit l'acquisition d'une résistance chez les plantes hôtes, les répercussions des conditions environnementales sur l'apparition des maladies, les seuils déclencheurs de maladie de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique.
- Le cas échéant, utiliser des modèles de prévision des maladies afin d'appliquer les fongicides au moment propice.
- Inspecter les populations fongiques traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Lorsque la maladie continue de progresser après traitement avec ce produit, ne pas augmenter la quantité utilisée. Cesser d'employer le produit et passer à un autre fongicide ayant un site ou un mode d'action différent, si possible.
- Limiter les applications de fongicide du Groupe 40 à 50% du nombre total d'applications prévues.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à BASF au 1-877-371-2273.

MÉLANGE

1. Remplir le réservoir à demi ou aux trois quarts avec de l'eau.
2. Mesurer précisément la quantité requise de **fongicide FORUM** et, en maintenant une agitation constante, verser le produit dans le réservoir.
3. Utiliser une mesure séparée calibrée pour le mélange et ajouter la quantité requise de mancozèbe, penncozèbe, métirame ou chlorothalonile au réservoir.
4. Remplir le réservoir avec de l'eau.

POLYRAM est une marque déposée de BASF SE, utilisée avec permission par BASF Canada Inc.

^{MC/MD}Tous les produits mentionnés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs compagnies respectives.

GROUPE

40

FONGICIDE

FONGICIDE FORUM

Fongicide pour utilisation dans les légumes du genre brassicacées, végétaux à bulbe, les cucurbitacées, légumes à fruits, ginseng, raisins, houblon, légumes à feuilles, les cultures de pomme de terre et les plantes ornementales en serre et à l'extérieur.

NE PAS appliquer sur des fleurs coupées ou les légumes cultivés en serre

USAGE AGRICOLE

SUSPENSION CONCENTRÉE

GARANTIE : diméthomorphe 500 g/L

NO. D'ENREGISTREMENT : 32026 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Contient du 1,2-benzisothiazoline-3-one à raison de 0,0212% à titre d'agents de conservation

CONTENU NET : 0,1 à Vrac

AVERTISSEMENT POISON



GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT

EN CAS D'URGENCE ASSOCIÉE À CE PRODUIT ET METTANT EN DANGER
LA VIE OU DES BIENS, TÉLÉPHONEZ LE JOUR OU LA NUIT
AU 1-800-454-2673

BASF Canada Inc.
100 Milverton Drive
5^e étage
Mississauga, Ontario
L5R 4H1
1-877-371-2273

FORUM est une marque déposée de BASF Corporation, utilisée avec permission par BASF Canada Inc.

PRÉCAUTIONS

1. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

2. Les travailleurs doivent en tout temps porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des gants et des bottes résistant aux produits chimiques. Ils doivent aussi porter une combinaison et des lunettes de sécurité ou un écran facial lors du mélange et du chargement du produit et lors des activités de nettoyage et de réparation. Si on utilise un équipement manuel à faible pression, les préposés au mélange, au chargement et à l'application doivent aussi porter une combinaison et des gants résistant aux produits chimiques.
3. Se laver les mains avant de manger, boire, fumer ou d'utiliser la toilette. Changer les vêtements de travail et prendre un bain ou une douche après la manipulation ou la pulvérisation du produit. Laver les vêtements de protection avant de les réutiliser.
4. Pour les pommes de terre, les plantes ornementales en serre et à l'extérieur et les légumes à fruits, ne pas pénétrer dans les zones traitées dans les 12 heures après l'application. Pour toutes les autres cultures veuillez consulter le Tableau spécifique des doses d'application pour la période de retrait.
5. Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive est à son minimum vers les zones habitées ou des secteurs d'activité humaine où l'on retrouve des demeures, maisons de campagne, écoles et des superficies consacrées aux loisirs. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, les inversions de température, l'équipement d'application et les ajustements du pulvérisateur.
6. Nettoyer l'équipement de pulvérisation soigneusement après l'usage.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Il n'existe aucun antidote spécifique. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

Garder en lieu sûr, dans un endroit frais, sec et bien ventilé, loin de tout aliment destiné à la consommation humaine ou animale et hors de la portée des enfants.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.